

**K.B. 27.1.2008    In werking 1.4.2008  
B.S. 21.2.2008**

- Wijzigen
- Invoegen
- Verwijderen

**Artikel 24 – KLINISCHE BIOLOGIE**

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor klinische biologie (P), vereist is :

**6/INFECTIEUZE SEROLOGIE**

**1/Bloed**

...

551132	551143	<span style="color: blue;">Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Cumulregel 326) (Diagnoseregul 79) Klasse 13</span>	B	250
--------	--------	---	---	-----

...

<u>552134</u>	<u>552145</u>	<u>Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Diagnoseregul 79) Klasse 14</u>	<u>B</u>	<u>300</u>
<u>552193</u>	<u>552204</u>	<u>Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregul 79) Klasse 24</u>	<u>B</u>	<u>1200</u>
<u>552215</u>	<u>552226</u>	<u>Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregul 79) Klasse 24</u>	<u>B</u>	<u>1200</u>

**9/Diversen**

...

<u>552156</u>	<u>552160</u>	<u>Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht (Maximum 1) Klasse 13</u>	<u>B</u>	<u>250</u>
<u>552171</u>	<u>552182</u>	<u>Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht (Maximum 1) Klasse 14</u>	<u>B</u>	<u>300</u>
<u>552230</u>	<u>552241</u>	<u>Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregul 79) Klasse 24</u>	<u>B</u>	<u>1200</u>
<u>552252</u>	<u>552263</u>	<u>Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregul 79) Klasse 24</u>	<u>B</u>	<u>1200</u>

## Diagnoseregels

...

### 79

De verstrekkingen 552193-552204, 552215-55226, 552230-552241 en 552252-552263 mogen enkel worden aangerekend aan de ziekte-en invaliditeitsverzekering indien één of meerdere van de verstrekkingen 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 of 552171-552182 een positief resultaat opleveren en bij duidelijke klinische tekens van een Lyme borreliose. Deze test mag maximaal één maal per kalenderjaar aangerekend worden.